

Ficha Técnica

FERTILIZANTE FOLIAR

El Surco **ZINC-BORO AMINO**® reúne en un sólo producto los principales elementos menores en la concentración y el balance adecuados así como la formulación idónea para una rápida y fácil absorción. Ideal para etapas iniciales de desarrollo y floración de los cultivos.

Composición Química	P/P
Zinc (Zn)	12.7 %
Boro (B)	6.0 %
Azufre (S)	6.4 %
Cobre (Cu)	1.8 %
Molibdeno (Mo)	0.05 %
Complejo de Aminoácidos	3.0 %
Polisacáridos	3.6 %
Ácidos húmicos y fúlvicos	1.45 %
Ingredientes inertes	65 %
Total	100.00 %

Los elementos menores, son requeridos en pequeñas cantidades por las plantas, pero son esenciales en la cantidad y balance adecuados para el desarrollo normal de todo cultivo, por lo que la escasez de alguno de ellos va a limitar el crecimiento normal del cultivo.

INSTRUCCIONES DE USO

El personal encargado debe estar capacitado y protegido con el equipo de seguridad y protección recomendado

DOSIS Y FRECUENCIA

Aplicación Foliar: Aplicar de 2 a 4 Kg por hectárea o 1-2 Kg por 200 litros de agua. Con una frecuencia que varía con el cultivo y el objetivo buscado.

Aplicación en fertirriego: Aplicar por el sistema de riego o en "drench" a la base de la planta a una semana de la siembra o trasplante y durante el desarrollo sobre el área de raíces, según criterio técnico o necesidad del cultivo. Usar de 4 – 6 Kg por Hectárea o 2 Kg por 200 litros de agua.

Registrado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica con el número: 5224.
Fabricado por ECOINSUMOS, S.A.